

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ



Ріпак

Сміттева домішка:	≤ 2,0 %
Вологість:	≤ 8,0 %
Ерукова кислота:	≤ 2,0 %
Кислотність:	≤ 2,0 %
Глюкозинолати:	≤ 25 мкмоль/гр
Олійність:	норма - 42% на сиру речовину, мінімум - 40% на сиру речовину (у разі менше 40% - за згодою Комісiонера)
Хлорпірифос (хлорпірифос метил):	≤ 0,01 мг / кг

Без ГМО

Зараженість Товару шкідниками не допускається

Має бути незігрите, у здоровому стані, мати колір і запах, притаманні нормальному насінню ріпаку (без затхлого, пліснявого та стороннього запахів).
Має відповідати вимогам ДСТУ 4966:2008.



Кукурудза

Кукурудза 3-го класу для кормових цілей українського походження, здорового товарного виду, без живого довгоносика та інших комах зернових шкідників, без цвілі, прихованої зараженості і нерадіоактивного. Амброзія не допускається.

Вологість:	≤ 14,5 %
Сміттева домішка:	≤ 2,0 %
Зернова домішка:	≤ 10% ,з них : -битих ≤ 5 % -пошкоджених ≤ 5 % (в т.ч. пошкоджених сушкою ≤ 2 %)
Радіоактивність:	нерадіоактивний, 600 Бекерелів/кг максимум по Цезію 134 і 137
Афлатоксини Б1:	≤ 5 мкг/кг
Дезоксиніваленол (ДОН):	≤ 2000 мкг/кг